

VIDA SILVESTRE DE CPE-6

Biodiversidad en el
Bloque CPE-6



Autores

Argelina Blanco

Bióloga

Sebastián Jiménez

Biólogo

Juana González

Equipo técnico

Fundación Orinoquia Biodiversa

Karen Pérez-Albarracín,

Bióloga

Carolina Pareja Ayerbe,

Ecóloga

Juan Sebastián Jiménez,

Mastozoólogo

David Gilberto Reyes,

Mastozoólogo

Kevin González Gutiérrez,

Mastozoólogo

Juan David Valencia,

Herpetólogo

Juliana Poveda,

Herpetóloga

Nelson Falcón,

Herpetólogo

Santiago Lugo,

Ornitólogo

Carolina Valencia,

Ornitólogo

Daniel Ruiz,

Ingeniero forestal

Yuliana Romero,

Ingeniera Forestal

Maria Alejandra Ramirez,

Ingeniera Ambiental

Sebastián Giraldo Dávila,

Ornitólogo

Jhon Fredy Estupiñan,

Mastozoólogo

Jaidy Yineth Puerta Estepa,

Ingeniera forestal

Edna Penagos Carvajal,

Administradora Ambiental

Eliana Muñoz Escobar,

Bióloga

Frontera Energy Colombia Corp.

Ximena Andrea Castro-Ordóñez,

Bióloga - Profesional ambiental

Maria Isabel Romero González,

Gerente de comunicaciones

Margarita Camelo Suárez,

Líder de cumplimiento ambiental

Héctor Ospina Valbuena,

Gerente ambiental

Andrés Palacios Sánchez,

Director HSEQ

Diseño y diagramación

Ana Maria Rodríguez,

Diseñadora

Sara Meche Zorro,

Diseñadora

Citación sugerida

Blanco, A., Jiménez, S., González, J. 2024.
Vida silvestre de CPE-6. Biodiversidad en el
Bloque CPE-6. Fundación Orinoquia Biodiversa
y Frontera Energy. XX Págs.

Esta publicación ha sido desarrollada en el marco del convenio interinstitucional Frontera Energy Colombia Corp. y Fundación Orinoquia Biodiversa para el diseño e implementación de los programas de monitoreo e investigación para las especies de fauna y flora en cumplimiento a fichas del Plan de Manejo Ambiental del Bloque CPE-6.

VIDA SILVESTRE DE CPE-6

Biodiversidad en el
Bloque CPE-6

Índice

	Pág.		Pág.
Introducción	4	Capítulo 3 / Anfibios	
Convenciones	5	Sapo gigante	50
Capítulo 1 / Flora		Rana lanceolada	51
Majaguillo	8	Rana punteada	52
Asaí	9	Rana listada	53
Moriche	10	Rana trompuda	54
Palma chuapo	11	Rana lechosa	55
Flor amarillo	12	Sapo toro	56
Palo de aceite	13	Rana rayada	57
Laurel	14	Ranita llanera	58
Arrayán	15	Rana verde verdadera	59
Cimarrú	16	Capítulo 4 / Reptiles	
Yarumo	17	Babilla	61
Capítulo 2 / Aves		Lagartija	62
Águila coliblanca	19	Güio	63
Rey de los gallinazos	20	Cuatro narices de agua	64
Alcaraván	21	Falsa mapanare	65
Carriquí violeta	22	Culebra tigre	66
Pajuil	23	Lagartija lisa	67
Guacharaca moteada	24	Lagartija rayada	68
Pava rajadora	25	Morrocoy	69
Jacamar barbiblanco	26	Taya equis	70
Oropendola	27	Capítulo 5 / Mamíferos	
Chirlobirlo	28	Mono aullador	72
Barranquero	29	Mono maicero	73
Carpintero real	30	Venado	74
Saltarín totiadador	31	Ocarro	75
Saltarín cola de alambre	32	Lapa	76
Saltarín cabecidorado	33	Picure	77
Loro real	34	Murciélago	78
Guacamayo de vientre rojo	35	Cunaguaro	79
Tucán	36	Puma	80
Mochuelo	37	Zorro gatuno	81
Mielero común	38	Perro de agua	82
Canario	39	Oso Palmero	83
Zamurita	40	Oso melero	84
Amazilia buchiblanca	41	Murciélago	85
Ermitaño rojizo	42	Murciélago	86
Trogón	43	Murciélago	87
Titirijí	44	Murciélago	88
Tijereta	45	Cusumbo	89
Bichofué	46	Danta	90
Fiofio	47	Chácharo	91
Pechiamarillo	48	Bibliografía	92

I Introducción

La Orinoquia alberga aproximadamente el 10% de la diversidad biológica mundial, posicionando a Colombia como uno de los países megadiversos del planeta. Dentro de esta región, el departamento del Meta destaca por sus ecosistemas únicos, como sabanas inundables, sabanas arboladas, bosques de galería, morichales y áreas de piedemonte, que cumplen funciones críticas como la regulación hídrica, la captura de carbono y el mantenimiento de la biodiversidad. Estas características hacen de esta zona un espacio de gran valor ecológico, económico y cultural.

No obstante, el Meta enfrenta crecientes presiones antrópicas debido a actividades agroindustriales y la expansión de infraestructura, lo que ha intensificado la fragmentación de hábitats y puesto en riesgo a muchas especies. En este contexto, en el Bloque CPE-6, ubicado en la vereda Kioscos, del municipio de Puerto Gaitán, se han llevado a cabo monitoreos de fauna y flora como parte de las obligaciones ambientales establecidas en la Licencia Ambiental. Estas acciones, realizadas en diferentes épocas climáticas, cumplen con los lineamientos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y buscan generar información clave para la gestión sostenible del territorio y la conservación de la biodiversidad.

Entre las actividades realizadas destacan el monitoreo multitemporal de flora y fauna, la instalación de parcelas permanentes para el seguimiento de vegetación, evaluaciones ecológicas rápidas y el uso de cámaras trampa. Estos esfuerzos han permitido caracterizar ecosistemas estratégicos como bosques de galería, bosques densos altos inundables y morichales, esenciales para la provisión de servicios ecosistémicos y el refugio de numerosas especies.

En cuanto a la fauna registrada, sobresalen especies como la danta (*Tapirus terrestris*), clave en la dispersión de semillas; el venado cola blanca (*Odocoileus cariacou*), característico de las sabanas; el ocarro (*Priodontes maximus*), armadillo terrestre más grande del mundo; el puma (*Puma concolor*), depredador tope; y el cunaguaro (*Leopardus pardalis*), un felino emblemático. En la flora, sobresalen el asaí (*Euterpe precatoria*), el moriche (*Mauritia flexuosa*) y la palma sancona (*Socratea exorrhiza*), especies esenciales para la provisión de alimentos y refugio.

Esta guía de especies tiene como objetivo compilar, divulgar y valorizar la riqueza biológica del Bloque CPE-6. A través de descripciones detalladas y fotografías, busca sensibilizar a comunidades locales, tomadores de decisiones y el público en general sobre la importancia de conservar los ecosistemas estratégicos del Meta.

La biodiversidad del Bloque CPE-6 no solo constituye un patrimonio natural invaluable, sino que también refleja los retos y oportunidades en términos de sostenibilidad ambiental. En un escenario de creciente presión sobre los recursos naturales, iniciativas como esta guía son fundamentales para fomentar una gestión responsable del territorio, asegurando la conservación de sus ecosistemas para las generaciones futuras.

Convenciones

Cada infografía de esta guía de especies se compone de diferentes categorías que explican el estado de conservación de las especies, gremio trófico, gremio ecológico y hábito ecológico.

Estado de conservación

El estado de amenaza de las especies está especificado de acuerdo a las categorizaciones nacionales (con la bandera de Colombia) e internacionales (con un punto verde) indicando los listados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.



Clasificación a nivel internacional

Para la asignación del estado de conservación se consultaron las bases de datos de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (IUCN). En estos listados se presentan los siguientes estados:



Preocupación
Menor



Casi Amenazada



Vulnerable



En Peligro



En Peligro
Crítico

Clasificación a nivel nacional

En Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), utiliza los siguientes estados para la conservación:



Vulnerable



En Peligro



En Peligro
Crítico

I Convenciones

Categorías de interés

Las categorías de interés, gremios tróficos y hábitos se establecieron de acuerdo con la historia de vida de las especies que fueron incluidas en esta guía de especies.

Gremio ecológico



Gremio ecológico
Esciofita parcial



Gremio ecológico
Heliofita durable

Hábito ecológico



Hábito
Diurno



Hábito
Diurno/
Nocturno



Hábito
Nocturno



Hábito
Crepuscular

Gremio trófico



Gremio Trófico
Hervívoro



Gremio Trófico
Carnívoro



Gremio Trófico
Insectívoro



Gremio Trófico
Omnívoro



Gremio Trófico
Frugívoro



Gremio Trófico
Granívoro



Gremio Trófico
Nectarívoro



Gremio Trófico
Carroñero

Atributos ecológicos de las especies



ESPECIE DEL PAISAJE



ESPECIE SOMBRILLA



ESPECIE REPRESENTATIVA EN LA ORINOQUÍA




ESPECIE CASI ENDÉMICA



ESPECIE BANDERA



Arrayán
Myrcia subsessilis O.Berg



Palo de aceite
Copaifera pubiflora Benth.



Palma sancona
Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl.



MajagUILlo
Guatteria schomburgkiana Mart.

CAPÍTULO 1

Flora

Majaguillo / Carguero / Caanuci / Burilico

Guatteria schomburgkiana Mart.

Plantas

GRUPO

Annonaceae

FAMILIA



Estado de
conservación
global



Gremio
ecológico
Heliofita durable

DATO CURIOSO

En el Valle del Cauca, un jardinero desarrolló un ingenioso método para simular el paso de las semillas por el tracto digestivo de las aves. Este proceso ayuda a facilitar su germinación y contribuye a evitar la extinción local de la especie.

DESCRIPCIÓN

Es un arbusto pequeño que puede crecer hasta 15 metros de altura. Sus hojas son de color verde intenso, alargadas y con la punta afilada. Las flores son blancas o amarillas, tienen seis pétalos y crecen donde se unen las hojas con las ramas. Sus frutos son pequeños y crecen de manera individual.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Oferta de madera, frutos comestibles y uso medicinal.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

• Bosque de galería y/o ripario



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 100 - 140 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie

Asaí / Maíz pepe / Palmicha

Euterpe precatoria Mart.

Plantas

GRUPO

Arecaceae

FAMILIA



Estado de
conservación
global



Gremio
ecológico
Heliofita durable

DESCRIPCIÓN

Es una palma que puede alcanzar entre 10 y 20 metros de altura, con un tronco recto y solitario que se apoya en raíces rojas visibles y muy juntas. Sus hojas forman una corona de 10 a 20 unidades, con muchas pinas (hojitas alargadas que conforman las hojas de las palmas). Las flores crecen en racimos con tallos pequeños de unos 20 cm. Los frutos son esféricos, de color violeta oscuro y miden aproximadamente 1 cm de diámetro. Las semillas son redondeadas.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Oferta de alimentos comercializables y frutos comestibles.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosque húmedo premontano
- Bosque de galería y/o ripario

DATO CURIOSO

Uno de los usos medicinales de esta planta es ayudar a prevenir la caída del cabello y promover su buen crecimiento.



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 2000 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie

Moriche / Aguaje / Burití / Morete

Mauritia flexuosa L.f.

Plantas

GRUPO

Arecaceae

FAMILIA



Estado de
conservación
global



Gremio
ecológico
Heliófita durable

DATO CURIOSO

Las raíces de este árbol no son profundas, pero pueden extenderse horizontalmente hasta 40 metros, cubriendo un área de hasta 0,5 hectáreas.

DESCRIPCIÓN

Es una palma que puede crecer hasta 40 metros de altura, con un tronco de hasta 60 cm de diámetro. Sus hojas, entre 15 y 20, forman una gran corona en la parte superior y tienen forma de abanico. Las flores masculinas y femeninas son similares. Estas crecen agrupadas en racimos entre las hojas, alcanzando de 2 a 4 metros de largo. Sus frutos son alargados, miden unos 7 cm y tienen un color café rojizo. Las raíces de esta palma son extensas y cuentan con estructuras llamadas neumatóforos, que sobresalen del suelo para facilitar la respiración.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Oferta de alimentos para la subsistencia alimentaria y alimento para la fauna local. Regulador del ciclo del agua en algunas regiones.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosque de galería y/o ripario



UBICACIÓN EN COLOMBIA

Entre los 40 - 450 m.s.n.m.

Zonas en las que se encuentra

● la especie

Palma chuapo

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl.

Plantas

GRUPO

Arecaceae

FAMILIA



Estado de
conservación
global



Gremio
ecológico
Esciofita parcial

DATO CURIOSO

Se dice que la planta "camina" porque, al buscar la luz, las raíces del lado que recibe más luz crecen más, mientras que las del otro lado mueren. Este proceso provoca la sensación de que la planta se desplaza.

DESCRIPCIÓN

Es una palma que puede crecer hasta 20 metros de altura, con un tronco solitario de color verde grisáceo y raíces visibles que pueden alcanzar entre 1 y 2 metros de largo. Tiene de 6 a 7 hojas con divisiones regulares en segmentos. La punta de las hojas es irregular y más ancha que la base, alcanzando entre 5 y 8 cm de ancho. Esta especie tiene flores masculinas y femeninas en la misma planta.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Oferta de materiales para construcción de techos y pisos en algunas tribus indígenas de la Amazonía. En algunas regiones amazónicas, tiene usos medicinales para tratar la hepatitis, náuseas, vómito, dolor de estómago y también como antiinflamatorio para la picadura de serpientes y abejas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo
- Bosque húmedo tropical
- Bosque de galería y/o ripario



UBICACIÓN

EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1000 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra la especie

Flor amarillo / Guayacán

Handroanthus chrysanthus
(Jacq.) S.O.Grose

Plantas

Bignoniaceae

GRUPO

FAMILIA



Estado de
conservación
global



Gremio
ecológico
Heliófita durable

DATO CURIOSO

Es conocido como el "árbol de oro" debido a su impresionante floración amarilla, que cubre todo el árbol y crea un espectáculo visual espectacular.

DESCRIPCIÓN

Es un árbol que puede alcanzar hasta 20 metros de altura, con una copa amplia y vistosa. Su corteza externa es gris y agrietada, mientras que la interna tiene un llamativo color amarillo. Las hojas son compuestas, en forma de mano, con 5 a 7 pinas (hojitas alargadas). Tiene grandes flores amarillas en forma de campana, que pueden medir hasta 10 cm. Sus frutos son cápsulas largas y delgadas, de 35 a 45 cm, que se abren en el árbol para liberar semillas con alas, dispersadas por el viento.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Madera industrializable o para la ebanistería.
Belleza escénica.



UBICACIÓN EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1000 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra la especie



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosque de galería y/o ripario

Aceite / Palo de aceite

Copaifera pubiflora Benth.

Plantas

GRUPO

Fabaceae

FAMILIA



Estado de
conservación
global



Gremio
ecológico
Esciofita parcial

DESCRIPCIÓN

Este árbol puede crecer hasta 30 metros de altura. Su tronco es recto y tiene una corteza amarilla que se desprende en pequeñas placas. Las hojas son grandes y tienen entre 4 y 6 folíolos, que tienen forma de óvalo. Las flores de este árbol son blancas y crecen en racimos en las puntas de las ramas, pero no tienen pétalos. El fruto de este árbol es una vaina que se abre por sí sola cuando está maduro. Dentro de esta vaina hay semillas negras cubiertas por una capa blanca.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Provisión de madera para construcción y otros usos medicinales.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosque de galería y/o ripario
- Bosque seco

DATO CURIOSO

El aceite de su corteza podría usarse directamente como biodiesel, ofreciendo una alternativa ecológica como fuente de energía renovable.



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 800 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Laurel / Palo jordán / Amarillo

Nectandra cuspidata Nees & Mart.

Plantas

GRUPO

Lauraceae

FAMILIA



Estado de
conservación
global



Gremio
ecológico
Heliófita durable

DATO CURIOSO

Se ha informado que posee compuestos antioxidantes, anticancerígenos y con actividad contra *Leishmania*, lo que le confiere un notable potencial para aplicaciones en salud.

DESCRIPCIÓN

Puede llegar a medir hasta 30 metros de altura. Su corteza es suave y de color gris y su tronco tiene raíces pequeñas que se extienden hacia los lados. Las hojas son simples y tienen forma lanceolada con un extremo puntiagudo y una base afilada. Las flores son blancas y tienen un aroma agradable. Los frutos son similares a los de un aguacate, pero mucho más pequeños. Cuando maduran, se ponen de color oscuro y tienen una especie de copa en la base.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Provisión de madera, uso medicinal y como colorante.



UBICACIÓN EN COLOMBIA

Entre los 0 - 2000 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra la especie



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosque húmedo premontano
- Bosque de galería y/o ripario

Arrayán

Myrcia subsessilis O.Berg

Plantas

GRUPO

Myrtaceae

FAMILIA



Estado de
conservación
global



Gremio
ecológico
Heliofita durable

DATO CURIOSO

Su corteza se utiliza como colorante rojizo, empleado en diversas aplicaciones, como textiles o productos artesanales.

DESCRIPCIÓN

Este árbol tiene una corteza externa agrietada. Sus hojas son simples, crecen de una en una en las ramas y no tienen estipulas (pequeñas hojas en la base del tallo). Las hojas forman una cruz a lo largo de la rama. Tienen forma elíptica y el borde es liso. Las ramas jóvenes son de color rojo. Los peciolo son cortos y no se notan mucho. Las flores crecen en racimos llamados panículas y tienen un cáliz abierto con cinco sépalos. Los frutos son drupas, de forma ovalada, de color rosado que se oscurecen a morado cuando maduran.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Provisión de madera para la cocina, fabricación de herramientas, frutos comestibles y alimento para la avifauna.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosque de galería y/o ripario



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 100 - 2300 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Cimarrú / Cedrillo / Aceituno / Amargo

Simarouba amara Aubl.

Plantas

Simaroubaceae

GRUPO

FAMILIA



Estado de
conservación
global



Gremio
ecológico
Heliófita durable

DATO CURIOSO

La corteza tiene propiedades antivirales y las hojas son utilizadas en el tratamiento del reumatismo.

DESCRIPCIÓN

Este árbol puede crecer hasta 35 metros de altura. Su tronco es recto y tiene una corteza lisa de color gris. La copa del árbol es irregular. Las ramas jóvenes son delgadas y de color verde. Las hojas miden unos 30 cm de largo y crecen en forma alterna a lo largo de las ramas. Tienen un número impar de partes, llamadas folíolos. Los folíolos tienen el borde liso y un extremo puntiagudo. Las flores son pequeñas, de color verde claro y se agrupan en racimos en las puntas de las ramas. Los pétalos de las flores son blancos o amarillos. Los frutos son carnosos, parecidos a aceitunas y se vuelven oscuros cuando maduran.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

**Provisión de madera para la fabricación de muebles.
Usos industriales y usos medicinales.**



UBICACIÓN EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1000 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra la especie



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosque de galería y/o ripario

Yarumo / Guarumo / Yarumo blanco

Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl.

Plantas

GRUPO

Urticaceae

FAMILIA



Estado de
conservación
global



Gremio
ecológico
Heliofita durable

DESCRIPCIÓN

Este árbol puede alcanzar hasta 30 metros de altura. Su copa es frondosa y las hojas son grandes, con una forma parecida a una mano (palmeadas) y una textura similar al cartón. No tienen exudados (líquidos que salen de las hojas). Los lóbulos de las hojas no son tan marcados como en otras especies del mismo género. La inflorescencia, que son las flores agrupadas, es masculina y crece en parejas. El pedúnculo (el tallo que sostiene las flores) es alargado y puede medir hasta 18 cm.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Alimento para la avifauna.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosque seco tropical
- Bosque húmedo premontano
- Bosque seco premontano
- Bosque de galería y/o ripario

DATO CURIOSO

El nombre de este árbol inspiró la serie de televisión *El profesor Yarumo*. Además, el género fue nombrado *Cecropia* en honor a "Cecrope", un personaje de la mitología griega, quien fue rey de Atenas.



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 100 - 1000 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie



Loro real
Amazona ochrocephala



Chirlobirlo
Sturnella magna



Mochuelo
Athene cunicularia

CAPÍTULO 2

Aves

Águila coliblanca

Geranoaetus albicaudatus

Aves

GRUPO

Accipitridae

FAMILIA



MIDE
61 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Carnívoro

DATO CURIOSO

Se siente atraída por las zonas incendiadas, ya que sabe que allí encontrará presas que intentan escapar del fuego, lo que le facilita la caza.

DESCRIPCIÓN

Es un ave rapaz que se distingue por su color gris pizarra en la parte superior del cuerpo, con los hombros de color marrón rojizo y una pequeña capa de plumas que cubre su cabeza. Su abdomen es blanco y su cola es también blanca, con una franja negra en la parte final. Los ojos son de color castaño y su cera (la parte de la piel sobre el pico) es de un verde pálido. Esta especie es fácilmente reconocible por su elegante apariencia y su comportamiento como cazadora en los cielos.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de vertebrados.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

• Sabanas



UBICACIÓN EN COLOMBIA

Entre los 0 - 2000 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie

Rey de los gallinazos

Sarcoramphus papa

Aves

Cathartidae

GRUPO

FAMILIA



PESA
3 - 3.7 kg



MIDE
67 - 81 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Carroñero

DATO CURIOSO

Tiene el hábito de desplazar a buitres más pequeños al encontrar una presa, lo que le ha dado el nombre de "Rey de los gallinazos" debido a su dominio sobre otros carroñeros.

DESCRIPCIÓN

Es un ave carroñera con plumaje de color blanco crema. Su cabeza es desnuda y tiene colores brillantes como naranja, amarillo, azul y negro, lo que la hace muy llamativa. Los ojos son de color blanco y el pico es naranja oscuro. Esta especie es conocida por su tamaño y por su papel en la naturaleza, ayudando a limpiar el entorno al alimentarse de animales muertos.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Ciclaje de nutrientes.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios
- Sabanas inundables
- Pastizales



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1500 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Alcaraván

Vanellus chilensis

Aves

GRUPO

Charadriidae

FAMILIA



MIDE
32 - 38 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Cuando su nido está en peligro, este ave adopta una táctica ingeniosa: finge estar herida para distraer a los depredadores y alejarlos de su cría.

DESCRIPCIÓN

Es un ave de tamaño mediano con un pico rosa que tiene la punta negra y patas también rosas. Una característica distintiva de esta especie es su cresta negra, larga y puntiaguda en la parte posterior de la cabeza. Su plumaje en la parte superior es de color gris, con los hombros de un tono verde bronceado. En su cara, frente, garganta y pecho son de color negro. Su vientre y rabadilla son blancos, mientras que la cola es negra.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Sabanas
- Pastizales



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 3100 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Carriquí violeta

Cyanocorax violaceus

Aves

Corvidae

GRUPO

FAMILIA



MIDE
33 - 37 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Tiene un sistema de cuidado cooperativo en el que varios adultos colaboran activamente en el cuidado de las crías, aumentando las probabilidades de supervivencia de las aves jóvenes.

DESCRIPCIÓN

Es un ave con plumaje de un color violeta azulado intenso en la mayor parte de su cuerpo. Su cuello y garganta son de un tono sepia, lo que crea un contraste elegante. Las partes inferiores de las alas y la cola son de color negro, al igual que el pico y las patas. Esta especie se destaca por su hermoso colorido y es común en bosques y áreas cercanas a zonas de vegetación densa.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 350 - 1350 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Pajuil

Mitu tomentosum

Aves

GRUPO

Cracidae

FAMILIA



MIDE
75 - 80 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Frugívoro

DATO CURIOSO

Es una ave nocturna y solitaria, que prefiere moverse rápidamente por el suelo y ocultarse en el denso follaje para evitar ser detectada.

DESCRIPCIÓN

Es un ave de plumaje principalmente negro, con un pecho de color azul brillante y un vientre de tono castaño. No tiene cresta en su cabeza, lo que lo diferencia de otras especies similares. Los machos tienen el pico y las patas de color rojo, mientras que las hembras presentan pico y patas amarillos.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

• Bosque húmedo tropical



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 500 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie

Guacharaca moteada

Ortalis guttata

Aves

Cracidae

GRUPO

FAMILIA



PESA
500 - 600 g



MIDE
45 - 60 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Emiten llamados estridentes al amanecer y al atardecer. Estos llamados suelen comenzar con un solo individuo y son seguidos por otros miembros de la misma especie en los alrededores.

DESCRIPCIÓN

Es un ave de tamaño mediano con un plumaje predominantemente marrón, con tonos más claros en la parte inferior del cuerpo. Su cuello y cabeza están cubiertos por escamas, lo que le da un aspecto texturizado. La característica más destacada es la piel roja brillante que tiene en la garganta, la cual contrasta con su plumaje más apagado. Sus ojos son grandes y de color oscuro, lo que le da una mirada intensa. La cola es relativamente larga y tiene un borde oscuro que también la hace distintiva. Las patas son de un color pálido.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios

UBICACIÓN EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1700 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie



Pava rajadora

Pipile cumanensis

Aves

GRUPO

Cracidae

FAMILIA



PESA
1200 - 1350 g



MIDE
60 - 69 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Este ave es conocida por su habilidad para "hacer sonar" el aire, cuando vuela emite un extraño sonido a través de sus plumas, lo que la hace aún más difícil de detectar para los depredadores.

DESCRIPCIÓN

Es un ave de cuerpo principalmente negro, con un distintivo parche blanco en las alas que resalta cuando vuela. Tiene un cuello largo y una cola también alargada, que le dan una apariencia elegante. Las patas de la pava rajadora son rojas, al igual que su pico, que es de un color azul vibrante. Una característica notable de esta especie es que el área alrededor de los ojos es desnuda, sin plumas, lo que le da un aspecto único. Su colorido y su forma corporal la hacen fácilmente reconocible.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN EN COLOMBIA

Entre los 0 - 500 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Jacamar barbiblanco

Galbula tombacea

Aves

GRUPO

Galbulidae

FAMILIA



PESA
21.5 - 25 g



MIDE
19 - 23.5 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

En lugar de volar de forma continua como la mayoría de aves, realizan rápidos y pequeños vuelos para cazar insectos, haciendo de su vuelo algo errático y distintivo.

DESCRIPCIÓN

Es un ave con un plumaje muy colorido y llamativo. Los machos tienen la frente de color café gris oscuro, mientras que la parte posterior de la cabeza presenta un tono verde azulado metálico. La espalda, rabadilla, pecho y garganta son de un verde oliva con reflejos bronce oscuros, creando un contraste atractivo. Debajo del pico, los machos tienen una pequeña área blanca y su vientre es de un tono rufo. Las hembras tienen un vientre de color rufo amarillento, lo que las diferencia ligeramente de los machos.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios

UBICACIÓN EN COLOMBIA

Entre los 300 - 1200 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie



Oropendola / Mochilero

Psarocolius decumanus

Aves

GRUPO

Icteridae

FAMILIA

PESA
206 g



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Frugívoro

DATO CURIOSO

Esta especie tiene un comportamiento raro de "volar en espiral" cuando se siente amenazada, en lugar de huir en línea recta. Sus nidos colgantes son también una obra maestra de la arquitectura aviar.

DESCRIPCIÓN

Es un ave de cuerpo principalmente negro, con el vientre de un tono castaño que contrasta con el resto del plumaje. Una de sus características más destacadas es su pico, que es grande, blanco y muy prominente. Los ojos de esta especie son de un color azul vibrante, lo que le da una mirada distintiva. Su aspecto es imponente debido al contraste entre el negro de su cuerpo y los detalles blancos y azules, lo que la convierte en una especie fácilmente reconocible.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0.2 - 600 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie

Chirlobirlo

Sturnella magna

Aves

GRUPO

Icteridae

FAMILIA



MIDE
20 - 24 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Tienden a formar parejas o grupos familiares durante la mayor parte del año. Utilizan cantos y posturas distintivas para comunicarse y reforzar la cohesión dentro de sus grupos.

DESCRIPCIÓN

Es un ave de cuerpo rechoncho, con una cola corta y patas relativamente largas. Su pico es largo y agudo, adaptado para su alimentación. Los adultos tienen la cabeza blanca, con listas negruzcas y gruesas a cada lado y detrás del ojo. El plumaje en la parte superior del cuerpo está fuertemente estriado de negro, lo que le da un aspecto distintivo. En la parte inferior, su pecho es de un amarillo brillante, con una amplia forma de "V" negra en la parte superior del pecho, lo que lo hace fácilmente identificable.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Sabanas
- Pastizales
- Cultivos



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 3500 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Barranquero

Momotus momota

Aves

GRUPO

Momotidae

FAMILIA



PESA
120 - 160 g



MIDE
43 - 48 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Conocida por mover la cola de lado a lado cuando se siente alarmada o en peligro, un comportamiento característico en momentos de amenaza.

DESCRIPCIÓN

Es un ave de colores vibrantes y una apariencia distintiva. Su dorso es de un verde brillante, mientras que el vientre tiene un tono verdoso más apagado. En el pecho presenta uno o dos puntos negros rodeados de un borde azul turquesa. Los muslos y los flancos son verdes, igual que su dorso. Su cola es larga y tiene una forma característica de raqueta en las puntas. El pico es tenue y ligeramente curvado hacia abajo, con bordes aserrados.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios
- Sabanas inundables



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1000 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie

Carpintero real

Dryocopus lineatus

Aves

GRUPO

Picidae

FAMILIA



MIDE
16 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

En las ciudades, esta especie de carpintero utiliza las lámparas metálicas o luminarias de las ciudades para picotearlas, creando un sonido amplificado de “tamborileo”.

DESCRIPCIÓN

Es un ave de tamaño robusto y una cresta roja prominente en la parte superior de su cabeza, que es una de sus características más notables. Los lados de la cabeza y la espalda son de color negro, con dos líneas blancas que recorren estas áreas, pero que no se unen entre sí. Además, presenta una línea blanca que comienza desde el pico, se extiende por debajo del ojo y baja por los lados del cuello, creando un contraste visual muy distintivo. Este plumaje llamativo hace que el carpintero real sea fácilmente reconocible en su hábitat.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosques secundarios
- Vegetación en regeneración
- Matorrales



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 2100 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Saltarín totiadador

Manacus manacus

Aves

GRUPO

Pipridae

FAMILIA



MIDE
10.2 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Este saltarín es uno de los más ruidosos entre sus congéneres, destacándose por sus llamadas vibrantes que atraen la atención en su entorno.

DESCRIPCIÓN

Es un ave pequeña y muy llamativa, conocida por el dimorfismo sexual en su plumaje. Los machos tienen un plumaje elegante, predominantemente blanco en la parte inferior y negro en las alas, la espalda y la cabeza. Este contraste les da un aspecto muy distintivo. Por otro lado, las hembras tienen un plumaje de tonos oliva, que les proporciona un camuflaje más discreto. Esta especie es famosa por los rituales de cortejo del macho, que incluyen movimientos rápidos y exhibiciones en el suelo del bosque.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1900 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Saltarín cola de alambre

Pipra filicauda

Aves

GRUPO

Pipridae

FAMILIA



MIDE
11.5 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Los machos de esta especie realizan un ritual de cortejo en parejas, donde bailan de manera sincronizada para atraer a las hembras.

DESCRIPCIÓN

Es un ave pequeña y vistosa que muestra un marcado dimorfismo sexual. Los machos tienen un plumaje llamativo con alas y cuello de color negro, mientras que la frente, el rostro y las partes inferiores son de un amarillo brillante y vibrante, lo que los hace altamente visibles. En contraste, las hembras presentan un plumaje más discreto, con tonos de verde oliva opaco y un ligero tinte amarillo en el rostro y el pecho. La parte inferior de las hembras es más grisácea, con el vientre más pálido, lo que les proporciona un camuflaje natural en su entorno.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 500 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Saltarín cabecidorado

Ceratopipra erythrocephala

Aves

GRUPO

Pipridae

FAMILIA



MIDE
9.1 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Omnívoro

DESCRIPCIÓN

Es un ave pequeña con características muy llamativas. Destaca por su marcado dimorfismo sexual. El macho tiene plumaje negro brillante, coronilla y lados de la cabeza amarillo dorado intenso, tibias rojas y blancas, pico blanco amarillento y patas pálidas o color carne. La hembra, en contraste, es de un verde oliva deslucido por encima, con partes inferiores más pálidas y tonos blanco amarillento en el vientre.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios

DATO CURIOSO

Los machos se agrupan en conjuntos permanentes de entre 6 y 12 individuos para llevar a cabo danzas colectivas con el fin de atraer a las hembras.



UBICACIÓN EN COLOMBIA

Entre los 0 - 500 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Loro real

Amazona ochrocephala

Aves

GRUPO

Psittacidae

FAMILIA



PESA

340 - 535 g



MIDE

35 - 38 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Frugívoro

DATO CURIOSO

Su voz es especialmente variada, pero destaca por ser más suave y musical en comparación con otras especies del género *Amazona*.

DESCRIPCIÓN

Es un ave de plumaje predominantemente verde, con un pico pálido característico. Su frente y el centro de la coronilla son de un amarillo brillante, lo que le da un toque distintivo. La cola tiene puntas amarillas y en las plumas externas presenta un llamativo color rojo en la base. Estas características lo hacen fácilmente reconocible.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios
- Sabanas inundables
- Zonas urbanas



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 500 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie

Guacamayo de vientre rojo

Orthopsittaca manilatus

Aves

GRUPO

Psittacidae

FAMILIA



PESA
292 - 390 g



MIDE
51 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Frugívoro

DATO CURIOSO

Esta especie tiene una característica única: en lugar de volar cuando alguien se acerca demasiado, se cuelga de una rama en una postura invertida, disimulando su presencia.

DESCRIPCIÓN

Es un ave principalmente verde, con la frente y los lados de la coronilla de color azul vibrante. Su rostro desnudo, de un tono amarillento y con textura rugosa, es una de sus características distintivas. El pecho y la garganta presentan un gris azulado, mientras que en el centro del abdomen destaca un parche de color rojo pálido, que le da su nombre común.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Sabanas inundables
- Palmares



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 500 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Tucán

Ramphastos tucanus

Aves

Ramphastidae

GRUPO

FAMILIA



PESA
515 - 830 g



MIDE
53 - 68 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

El pico del tucán, aunque es grande y llamativo, es sorprendentemente ligero. Esto se debe a que en su interior posee numerosas cavidades llenas de aire, lo que reduce significativamente su peso.

DESCRIPCIÓN

Es un ave grande y llamativa, con un plumaje predominantemente negro y un largo pico característico. Destaca por su babero blanco, que está bordeado en la parte inferior por una delgada banda roja. Sus ojos son de un color azul vibrante. Su pico es negro con la base de la mandíbula de un tono amarillo distintivo, lo que completa su apariencia única y colorida.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios
- Sabanas inundables



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1000 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Mochuelo

Athene cunicularia

Aves

GRUPO

Strigidae

FAMILIA



MIDE
19 - 25 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno/
Nocturno



Gremio trófico
Carnívoro

DATO CURIOSO

Es un cazador principalmente terrestre que suele caminar o correr sobre el suelo en busca de presas, realizando vuelos cortos y rápidos desde una percha para capturarlas. Presenta comportamiento territorial, donde las parejas defienden activamente el área alrededor de su madriguera frente a posibles intrusos.

DESCRIPCIÓN

Es un ave pequeña de apariencia distintiva. Su dorso es de color café con un patrón barrado, mientras que su vientre es blanco, creando un contraste marcado. Tiene iris de un llamativo color amarillo limón, pico de tono crema, patas largas y delgadas, y una cola corta que complementa su cuerpo compacto. Estas características lo hacen fácilmente reconocible entre las rapaces.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de vertebrados.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Sabanas
- Pastizales
- Cultivos



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 500 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Mielero común / Bananero

Coereba flaveola

Aves

GRUPO

Thraupidae

FAMILIA



PESA
6.4 - 14.2 g



MIDE
11 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Frugívoro

DATO CURIOSO

Tiene la capacidad de cambiar el color de su plumaje según el ángulo desde el que lo mires. Este fenómeno es un mecanismo de camuflaje para escapar de sus depredadores.

DESCRIPCIÓN

Es un ave pequeña con un pico corto, puntiagudo y ligeramente curvado hacia abajo. Su plumaje en la parte superior varía de gris parduzco a oliva oscuro, mientras que su garganta es de un tono grisáceo. Las partes inferiores destacan por su color amarillo brillante, que contrasta con los tonos más apagados de su dorso, haciendo de esta especie una presencia vibrante y reconocible.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Sabanas
- Pastizales
- Cultivos



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 2000 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Canario

Sicalis flaveola

Aves

GRUPO

Thraupidae

FAMILIA



PESA
12 - 24 g



MIDE
13.5 - 15 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Granívoro

DATO CURIOSO

Este canario es muy tolerante a los hábitats modificados por el ser humano, encontrándose frecuentemente en áreas urbanas e incluso en cultivos agrícolas.

DESCRIPCIÓN

Es un ave pequeña y colorida. El macho se distingue por su plumaje amarillo brillante, con un toque anaranjado saturado en la frente. Las hembras presentan un colorido más discreto, con tonos amarillos apagados y menos saturados, lo que las camufla mejor en su entorno natural.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Sabanas
- Pastizales
- Cultivos
- Zonas urbanas



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 2000 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Zamurita

Phimosus infuscatus

Aves

GRUPO

Threskiornithidae

FAMILIA



MIDE
46 - 56 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Esta especie se caracteriza por formar grandes grupos, ya sea de individuos de su propia especie o con otras especies de aves, lo que facilita la protección mutua.

DESCRIPCIÓN

Es un ave de plumaje negro con reflejos verde azulado, especialmente en las alas, lo que le da un aspecto brillante. Su pico es rojizo y curvado, tiene el mismo color que su cara, lo que resalta su rostro. Esta especie se distingue por su elegante plumaje y su pico característico.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de vertebrados.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Cuerpos de agua naturales y artificiales
- Cultivos



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1000 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Amazilia buchiblanca

Chionomesa fimbriata

Aves

GRUPO

Trochilidae

FAMILIA



MIDE
8 - 12 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Nectarívoro

DATO CURIOSO

En lugar de alimentarse de una sola planta, son conocidos por visitar una amplia variedad de flores, lo que les da una dieta muy variada en comparación con otros colibríes.

DESCRIPCIÓN

Es un colibrí de tamaño pequeño a mediano, con un plumaje llamativo que combina elegancia y funcionalidad. Su dorso presenta un tono que varía entre dorado y verde bronceado, mientras que la garganta y el pecho muestran un color verde vibrante que se destaca bajo la luz. El pico, largo y recto, es predominantemente negruzco, diseñado para alimentarse del néctar de las flores y complementar su dieta con pequeños insectos.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Polinización.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosques secundarios
- Matorrales



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1100 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Ermitaño rojizo

Phaethornis ruber

Aves

GRUPO

Trochilidae

FAMILIA



MIDE
8.1 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Nectarívoro

DATO CURIOSO

Este colibrí es conocido por ser el más pequeño dentro de los colibríes ermitaños, destacándose por su tamaño diminuto y su agilidad en el vuelo.

DESCRIPCIÓN

Es un colibrí de tamaño pequeño que se distingue por su plumaje sobrio pero atractivo. Su parte superior es de un color oliva oscuro, mientras que la parte inferior, incluyendo la rabadilla, es de un tono canela cálido que le da su nombre común. Los machos poseen una banda pectoral negra incompleta, un rasgo distintivo que contrasta con los tonos más claros de su vientre. Además, presentan alas y cola más cortas en comparación con las hembras, quienes tienen una silueta más estilizada.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Polinización.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosques secundarios
- Matorrales



UBICACIÓN EN COLOMBIA

Entre los 0 - 500 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Trogón

Trogon viridis

Aves

GRUPO

Trogonidae

FAMILIA



MIDE
25 - 28 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Estos trogones construyen sus nidos en huecos de árboles y suelen poner entre 2 a 3 huevos, un número reducido que asegura la atención de los padres hacia cada cría.

DESCRIPCIÓN

Es una de las aves más vistosas de su entorno, con un marcado dimorfismo sexual que facilita la identificación entre machos y hembras. Los machos exhiben un dorso de color azul turquesa brillante con alas de un tono verde metálico que resplandece bajo la luz del sol. Las hembras, en contraste, tienen una coloración más discreta, predominando tonos grises en su cuerpo. Ambos sexos comparten un vientre amarillo intenso con visos anaranjados y un llamativo anillo ocular azul que resalta sobre su rostro.


SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1170 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Titirijí

Todirostrum cinereum

Aves

GRUPO

Tyrannidae

FAMILIA



PESA
4.4 - 8 g



MIDE
8.8 - 10.2 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Cuando se encuentra en peligro, emite un grito similar al de una serpiente, lo que engaña a los depredadores y los aleja.

DESCRIPCIÓN

Es un ave pequeña y activa que se destaca por su combinación de colores contrastantes y su aspecto vivaz. Presenta una frente, coronilla y lados de la cabeza de un negro lustroso que brilla a la luz, en contraste con su espalda de un verde oliva suave. Sus alas son predominantemente negras, pero los bordes y las puntas están decorados con llamativos tonos amarillos, que añaden un toque vibrante a su plumaje.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosques secundarios
- Cuerpos de agua naturales y artificiales
- Zonas inundables



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1900 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie



Tijereta

Tyrannus savana

Aves

GRUPO

Tyrannidae

FAMILIA



MIDE

Macho 38 cm ≈

Hembra 28 cm ≈



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Tiene dos tipos de poblaciones: una residente, que permanece en Colombia durante todo el año y otra migratoria. Las poblaciones migratorias suelen presentar alas más largas que las residentes, una adaptación que les facilita realizar vuelos de larga distancia.

DESCRIPCIÓN

Es un ave inconfundible por su elegante cola extremadamente larga y profundamente ahorquillada, que utiliza con destreza en sus vuelos acrobáticos. Su plumaje presenta un patrón distintivo: la coronilla, nuca y lados de la cabeza hasta debajo de los ojos son de un negro intenso, contrastando con su espalda gris claro. Las alas son de un tono más oscuro, mientras que la cola es completamente negra. Las partes inferiores son uniformemente blancas, creando un marcado contraste con las tonalidades superiores.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Sabanas
- Pastizales
- Cultivos
- Zonas urbanas



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 2600 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Bichofué

Pitangus sulphuratus

Aves

GRUPO

Tyrannidae

FAMILIA



MIDE
22 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Son aves monógamas que forman parejas de por vida, lo que les permite compartir el cuidado de su territorio y sus crías.

DESCRIPCIÓN

Es un ave llamativa, fácilmente reconocible por su vientre amarillo brillante que contrasta con el resto de su plumaje. Sus alas y cola son de un tono marrón cálido, con bordes que presentan matices rojizos. Además, lleva una distintiva máscara negra que cubre sus ojos, coronada por una línea blanca sobre la cabeza, lo que le da una apariencia singular.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de invertebrados y pequeños vertebrados.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosques secundarios
- Matorrales
- Sabanas
- Zonas urbanas

UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1500 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Fiofio

Myiopagis gaimardii

Aves

GRUPO

Tyrannidae

FAMILIA



PESA
12 - 13 g



MIDE
12 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Estas aves suelen observarse solitarias, pero a menudo siguen bandadas mixtas de otras especies para aprovechar los recursos alimenticios de la zona.

DESCRIPCIÓN

Es un ave pequeña y discreta con un plumaje que combina tonos suaves y elegantes. Sus partes inferiores son de un amarillo tenue, mientras que las superiores presentan un color oliva que le permite camuflarse en el follaje. Destaca por sus barras alares de un amarillo pálido y una cabeza gris que contrasta con su distintiva ceja blanca. Una delgada línea negra se extiende desde el ojo, añadiendo un detalle característico a su rostro.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1000 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Pechiamarillo

Tolmomyias flaviventris

Aves

GRUPO

Tyrannidae

FAMILIA



PESA
9 - 17.5 g



MIDE
12 - 12.7 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Es conocida por su "danza aérea" cuando está buscando pareja. Realiza vuelos verticales y circulares, lo que le da una apariencia casi de "bailarín" en el aire.

DESCRIPCIÓN

Es un ave pequeña y de apariencia delicada, reconocible por su rostro predominantemente amarillo, que le otorga un aire vivaz. Su dorso presenta un tono amarillento suave que se integra armoniosamente con su entorno, mientras que el vientre es más claro, casi blanco, creando un contraste sutil con el resto de su plumaje.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosques secundarios
- Cuerpos de agua naturales y artificiales
- Zonas inundables


UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1000 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie

CAPÍTULO 3

Anfibios




Rana verde verdadera
Lithobates palmipes



Rana lechosa
Trachycephalus typhonius



Rana rayada
Lithodytes lineatus



Sapo gigante

Rhaebo guttatus

Anfibios

GRUPO

Bufonidae

FAMILIA



MIDE

Macho 12 - 15 cm ≈

Hembra 17 cm ≈



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Segrega un fluido amarillo/naranja alcaloide, que contiene compuestos tóxicos utilizados como defensa.

DESCRIPCIÓN

Este es un sapo de color café rojizo, con pequeñas verrugas de tono arcilloso en su piel y un vientre que puede ser café oscuro o gris. Los machos son más pequeños, midiendo entre 12 y 15 cm, mientras que las hembras pueden llegar a los 17 cm. Tiene patas traseras cortas y glándulas grandes y visibles detrás de los ojos, llamadas glándulas parotoides, que producen un veneno de color amarillo anaranjado.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

• Bosque húmedo tropical

UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 50 - 860 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie



Rana lanceolada

Boana lanciformis

Anfibios

GRUPO

Hylidae

FAMILIA



MIDE

Macho 6.3 - 7.6 cm ≈

Hembra 6.9 - 8.4 cm ≈



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Tiene la capacidad de saltar grandes distancias gracias a sus extremidades traseras largas y fuertes.

DESCRIPCIÓN

Es una rana grande de color café que tiene una línea clara a lo largo del labio. Su garganta es marrón con puntitos y el vientre es de color crema. El hocico es alargado y tiene un tímpano muy visible, casi del mismo tamaño que el ojo. Los dedos externos de las manos tienen membranas, pero los internos no. En los pies, las membranas cubren alrededor de dos tercios de la longitud de los dedos. La piel de la parte de arriba (dorsal) es lisa, mientras que la del vientre es más rugosa o granulada.


SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

• Bosque húmedo tropical



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1650 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie

Rana punteada

Boana punctata

Anfibios

GRUPO

Hylidae

FAMILIA



MIDE

Macho 3 - 4 cm ≈

Hembra 3.4 - 4 cm ≈



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Posee la habilidad de “brillar en la oscuridad” debido a que su piel permite la transmisión de luz verde y roja mientras bloquea la luz azul.

DESCRIPCIÓN

Es una rana de color verde amarillento con líneas a lo largo de los lados de su cuerpo y pequeños puntos rojos distribuidos en su piel. Su tamaño es pequeño a mediano y tiene una cabeza ancha con un hocico redondeado. Sus dedos tienen discos expandidos que le ayudan a trepar. Además, los machos tienen una característica distintiva: una espina visible en la mano.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

• Bosque húmedo tropical



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1500 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie

Rana listada

Scinax ruber

Anfibios

GRUPO

Hylidae

FAMILIA



MIDE

Macho 2.9 - 4.1 cm ≈

Hembra 3.7 - 4.3 cm ≈



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Su coloración en tonos verdes y amarillos actúa como camuflaje natural en su entorno de selvas tropicales.

DESCRIPCIÓN

Es una rana de color café o amarillo verdoso, con bandas claras a lo largo de los lados del cuerpo. Las ingles y la parte superior de los muslos son de un color amarillo o naranja, mientras que el vientre es crema o amarillo. Es de tamaño mediano. Sus dedos tienen discos expandidos que le ayudan a trepar y tiene pequeños tubérculos a lo largo del borde de la mandíbula.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosques secundarios
- Sabanas inundables



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1750 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie



ESPECIE
CASI
ENDÉMICA

Rana trompuda

Scinax wandae

Anfibios

GRUPO

Hylidae

FAMILIA



MIDE
2 - 3 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Su piel altamente permeable les permite absorber agua rápidamente en su ambiente húmedo.

DESCRIPCIÓN

Es una rana pequeña con colores que van desde marrones claros hasta grisáceos. Presenta membranas interdigitales y discos en los dedos que le facilitan trepar. Tiene un hocico redondeado y ojos de color marrón, con algunas manchas de café oscuro en su rostro que le dan un patrón distintivo.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosques secundarios
- Sabanas inundables



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 800 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Rana lechosa

Trachycephalus typhonius

Anfibios

GRUPO

Hylidae

FAMILIA



MIDE

Macho 7 - 10 cm ≈

Hembra 9 - 11.4 cm ≈



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Desciende de los árboles para reproducirse después de fuertes lluvias, formando grandes coros para atraer a las hembras a los charcos temporales.

DESCRIPCIÓN

Es una rana que mide aproximadamente 8 cm de longitud, siendo las hembras más grandes que los machos. Sus ojos son grandes, con pupilas elípticas rodeadas por flecos dorados. Su coloración corporal es muy variada, generalmente con manchas de color café bordeadas de negro sobre un fondo gris o café claro. El vientre es claro y carece de manchas. Su piel es granular y cuenta con glándulas que secretan una sustancia tóxica, parecida a una resina blanca y pegajosa, que sirve para aturdir a sus depredadores.


SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

• Bosque húmedo tropical



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1700 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie

Sapo toro

Leptodactylus knudseni

Anfibios

Leptodactylidae

GRUPO

FAMILIA



MIDE

Macho 9.4 - 17 cm ≈

Hembra 10.2 - 15.4 cm ≈



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Construye cuevas inundables que permiten que los renacuajos migren hacia pozas de agua cuando las lluvias cesan.

DESCRIPCIÓN

Es una rana grande de color café anaranjado o verdoso. Tiene una línea negra distintiva que comienza en el hocico, pasa por la narina y se extiende hasta detrás del tímpano. Su vientre es de color crema. Posee un cuerpo robusto y liso. Los machos presentan dos espinas en el pecho y una en el pulgar, lo que los diferencia de las hembras.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

• Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 650 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie

Rana rayada

Lithodytes lineatus

Anfibios

GRUPO

Leptodactylidae

FAMILIA



MIDE

Macho 3.3 - 4.5 cm ≈

Hembra 4.4 - 5.6 cm ≈



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Su coloración llamativa y la forma de su cuerpo imitan a algunas ranas venenosas, un ejemplo de mimetismo.

DESCRIPCIÓN

Es una rana mediana con un dorso negro y líneas dorsolaterales muy llamativas que pueden ser de color amarillo o bronce. Estas líneas se extienden desde la narina hasta las ingles. A diferencia de otras especies, no tiene discos expandidos en los dedos.


SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1026 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie



ESPECIE
DEL PAISAJE

Ranita llanera

Pseudopaludicola llanera

Anfibios

GRUPO

Leptodactylidae

FAMILIA



MIDE

Macho 1.2 - 1.4 cm ≈

Hembra 1.3 - 1.7 cm ≈



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno/
Nocturno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Prefiere las sabanas y pastizales inundado. Su canto es uno de los más sonoros entre las ranas de su familia.

DESCRIPCIÓN

Esta pequeña rana tiene un color marrón claro con manchas oscuras y su vientre es de un tono crema. A diferencia de otras especies de su género, la ranita llanera no presenta un tubérculo en el talón, lo que la hace fácilmente identificable. Habita áreas de pastizales y llanuras, donde se adapta a condiciones de humedad constante. Su tamaño pequeño y su camuflaje eficaz la protegen de depredadores.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosques secundarios
- Sabanas inundables



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 80 - 200 m.s.n.m.

- Zonas en las que habita la especie

Rana verde verdadera

Lithobates palmipes

Anfibios

GRUPO

Ranidae

FAMILIA



MIDE

Macho 5.5 - 10 cm ≈

Hembra 7.8 - 12.6 cm ≈



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Es una nadadora excepcional, moviendo sus patas traseras como remos para desplazarse rápidamente en el agua.

DESCRIPCIÓN

Esta rana es grande, de color verde brillante con flancos y extremidades cafés con manchas oscuras. Su vientre es crema amarillento. Presenta pliegues dorsolaterales conspicuos, que son fácilmente visibles y membranas extensas entre los dedos de los pies, lo que le permite nadar con gran habilidad. Es común en zonas boscosas con cuerpos de agua corrientes como riachuelos y quebradas.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS


- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1000 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie



Culebra tigre
Spilotes pullatus



Morrocóy
Chelonoidis carbonarius



Lagartija
Anolis scypheus

CAPÍTULO 4

Reptiles

Babilla / Cachirre

Caiman crocodilus

Reptiles

GRUPO

Alligatoridae

FAMILIA



PESA
Hasta 65 kg



MIDE
Macho 1.1 - 2.7 m
Hembra 1.1 - 2.2 m



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno/
Nocturno



Gremio trófico
Carnívoro

DATO CURIOSO

Aunque es una especie nocturna, disfruta del sol durante el día, especialmente en las playas de los ríos, lo que permite su observación a lo largo de todo el día.

DESCRIPCIÓN

Es un reptil grande de aspecto robusto, con un cuerpo alargado y cubierto por escamas duras. Su dorso tiene tonalidades que van desde el café oliva hasta el amarillo, a menudo con una apariencia moteada. En los juveniles es posible ver barras oscuras en la cola, lo que les otorga una apariencia distintiva. El vientre es de un color crema o blanquecino, brindándole un contraste con la parte superior. Sus ojos son prominentes, con un iris dorado o amarillo que resalta sobre su cabeza, dándole una mirada penetrante.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de pequeños mamíferos, aves, reptiles y anfibios.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

• Cuerpos de agua naturales y artificiales



UBICACIÓN EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1000 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie

Lagartija

Anolis scypheus

Reptiles

GRUPO

Anolidae

FAMILIA



PESA
15 - 20 g



MIDE
Hasta 8 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Tiene una asombrosa capacidad para camuflarse en los troncos de árboles y arbustos, lo que la hace casi invisible para los depredadores y presas.

DESCRIPCIÓN

Este lagarto pequeño es fácilmente reconocible por su cabeza grande y hocico corto, características que lo hacen destacar dentro de su familia. Su color es un marrón cobrizo que cubre su dorso, adornado con manchas en forma de rombos. En ambos sexos, destaca un abanico gular grande, con una base azul brillante y bordes rojos, lo que le da un aire llamativo y vibrante. Este abanico lo utilizan principalmente para atraer a las hembras y para defender su territorio. Su cola es delgada y generalmente se mueve con rapidez, lo que lo hace muy ágil en su entorno arbóreo.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

• Bosque húmedo tropical



UBICACIÓN EN COLOMBIA

Entre los 150 - 950 m.s.n.m.

● Zonas en las que habita la especie



ESPECIE
BANDERA

Güio

Eunectes murinus

Reptiles

GRUPO

Boidae

FAMILIA



PESA
Hasta 30 - 80 kg



MIDE
Macho 2,5 m ≈
Hembra 4 m ≈



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Carnívoro

DATO CURIOSO

Es la serpiente de mayor tamaño del neotrópico, alcanzando impresionantes longitudes de hasta 15 metros.

DESCRIPCIÓN

El güio es una de las serpientes más grandes del mundo. Es de color verde con manchas, lo que le ayuda a esconderse en el bosque y en el agua. Mata a sus presas apretándolas (constricción) con su cuerpo. Tiene la nariz hacia arriba, por eso puede respirar mientras está sumergida en el agua. Por su tamaño y fuerza, es uno de los animales más fuertes de su hábitat.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de pequeños mamíferos, aves, reptiles y anfibios.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Cuerpos de agua naturales o artificiales
- Sabanas inundables



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1000 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Cuatro narices de agua

Helicops angulatus

Reptiles

GRUPO

Colubridae

FAMILIA



PESA
1 - 2 kg



MIDE
40 - 50 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Carnívoro

DATO CURIOSO

Esta serpiente puede permanecer sumergida bajo el agua hasta 20 minutos, una habilidad que le permite cazar más eficazmente y evadir posibles depredadores.

DESCRIPCIÓN

Es una serpiente acuática, gruesa y alargada, con escamas ásperas. Tiene elomo con anillos cafés y el vientre claro o rojizo con manchas oscuras intercaladas de forma rectangular a manera de tablero de ajedrez. Vive en ríos y lagunas, donde nada muy bien para atrapar su comida.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de peces y anfibios.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Cuerpos de agua naturales o artificiales
- Sabanas inundables



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 750 m.s.n.m.

- Zonas en las que habita la especie

Falsa mapanare

Leptodeira ashmeadii

Reptiles

GRUPO

Colubridae

FAMILIA



PESA

100 - 150 g



MIDE

Macho 3.3 - 5.4 cm

Hembra 3.3 - 8 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Carnívoro

DATO CURIOSO

Se reproduce durante los picos de lluvias, con camadas de entre 2 y 7 huevos, lo que aumenta las probabilidades de supervivencia en condiciones favorables.

DESCRIPCIÓN

Es una serpiente delgada de color marrón o pardo, con manchas oscuras que están bordeadas por un contorno negro lo que le da un patrón irregular a lo largo de su cuerpo. Aunque su veneno es menos potente que el de otras serpientes, tiene una habilidad excepcional para moverse entre los árboles y arbustos, esto le permite ser un hábil cazador de pequeñas presas.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de peces y anfibios.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1000 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Culebra tigre

Spilotes pullatus

Reptiles

GRUPO

Colubridae

FAMILIA



PESA

3 - 5 kg



MIDE

1.5 - 2.5 m



Estado de
conservación
global



Hábito
Crepuscular



Gremio trófico
Carnívoro

DATO CURIOSO

Su reproducción se da principalmente durante la primera mitad del año, con posturas grandes que pueden variar entre 15 y 25 huevos, lo que asegura una mayor descendencia.

DESCRIPCIÓN

Su característica más destacada son las bandas alternas de color negro y amarillo que recorren su cuerpo que le dan un aspecto brillante y llamativo, especialmente en las áreas más cercanas a la cabeza. Los patrones en su piel pueden variar en intensidad desde colores más claros hasta tonos más oscuros. Además de su apariencia, es conocida por su agilidad y por su capacidad para trepar árboles y moverse a gran velocidad. A pesar de su aspecto intimidante no representa un peligro para los humanos.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de pequeños mamíferos, aves, reptiles y anfibios.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1200 m.s.n.m.

- Zonas en las que habita la especie

Lagartija lisa

Varzea altamazonica

Reptiles

GRUPO

Scincidae

FAMILIA



PESA
150 - 300 g



MIDE
15 - 20 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Este lagarto es un nadador excepcional, a menudo encontrado cerca de cuerpos de agua, como ríos y lagunas, donde se desplaza con agilidad tanto en el agua como en tierra.

DESCRIPCIÓN

Tiene un cuerpo de un color marrón rojizo que se mezcla con una franja lateral marrón oscura, la cual está acompañada por una línea crema que va desde el hocico hasta la cola. El calango tiene un cuerpo robusto y patas fuertes que le permiten escalar con facilidad. Su cola es bastante larga y en muchos casos, puede ser utilizada para equilibrarse cuando se mueve entre la vegetación densa de la Amazonía.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 150 - 780 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie

Lagartija rayada

Kentropyx striata

Reptiles

GRUPO

Teiidae

FAMILIA



PESA
15 - 30 g



MIDE
Hasta 12 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Cuando se siente amenazado tiene la capacidad de desprender su cola, un mecanismo de defensa que le permite escapar y la regenerará con el tiempo.

DESCRIPCIÓN

Se distingue por el patrón de rayas longitudinales que recorren su cuerpo desde la cabeza hasta la cola. Las rayas alternan entre colores claros y oscuros. Su color varía entre verde oliva, marrón y gris. Esta especie es conocida por su agilidad y rapidez. Es capaz de moverse rápidamente tanto en el suelo como en las rocas o troncos de los árboles. Además de sus rayas, la lagartija tiene una postura erguida y unas patas fuertes que le permiten moverse rápidamente.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

• Sabanas inundables

UBICACIÓN EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1400 m.s.n.m.

● Zonas en las que habita la especie





ESPECIE
REPRESENTATIVA
EN LA ORINOQUÍA

Morrocoy

Chelonoidis carbonarius

Reptiles

GRUPO

Testudinidae

FAMILIA



PESA
Hasta 13.9 kg



MIDE
Hasta 51 cm



Estado de
conservación
global



Estado de
conservación
nacional



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Puede vivir más de 100 años.

DESCRIPCIÓN

Es una tortuga terrestre con un caparazón característico de color negro o pardo oscuro que presenta manchas amarillas, naranjas o rojizas. Su parte inferior es amarilla. En la cabeza y las patas delanteras tiene manchas rojas y naranjas. Es una especie que se adapta muy bien a su entorno y es conocida por su lento ritmo de vida. Su caparazón robusto le proporciona una excelente protección contra depredadores, permitiéndole sobrevivir en condiciones adversas.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios
- Sabanas



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1000 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie

Cuatro narices / Mapaná/Talla X

Bothrops atrox

Reptiles

Viperidae

GRUPO

FAMILIA



PESA
0.5 - 1 kg



MIDE
Macho 78 cm - 1.2 m ≈
Hembra 77 cm - 1.7 m ≈



Estado de
conservación
global



Hábito
Crepuscular



Gremio trófico
Carnívoro

DATO CURIOSO

A pesar de su aspecto intimidante, prefiere evitar el contacto con los humanos. Sin embargo, cuando se siente amenazada, es capaz de atacar con rapidez.

DESCRIPCIÓN

Esta serpiente venenosa se reconoce fácilmente por su patrón de manchas rectangulares que forman una "X" en su espalda. Su coloración varía desde el café hasta el gris o casi negro y su vientre es de un tono amarillento. Su cola es corta y su cuerpo es robusto, lo que le permite moverse lentamente pero con gran sigilo. A menudo, la Talla X se encuentra en áreas densamente vegetadas, donde se camufla perfectamente gracias a su coloración.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de pequeños mamíferos, aves, reptiles y anfibios.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios
- Sabanas

UBICACIÓN EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1200 m.s.n.m.

- Zonas en las que habita la especie



CAPÍTULO 5

Mamíferos



Oso palmero
Myrmecophaga tridactyla



Cunaguaro
Leopardus pardalis



Chacharo
Dicotyles talacoti



Venado
Odocoileus cariacou



ESPECIE
BANDERA

Araguato/ Mono aullador

Alouatta seniculus

Mamíferos

Atelidae

GRUPO

FAMILIA



PESA
Macho 7.5 kg ≈
Hembra 6.3 kg ≈



MIDE
Cuerpo 44 - 69 cm
Cola 54 - 79 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Hervívoro /
Frugívoro

DATO CURIOSO

Son los animales mas ruidosos del continente americano. El sonido es tan fuerte que puede transportarse por 30 kilometros.

DESCRIPCIÓN

Tienen pelaje rojizo y al igual que otras especies de monos aulladores, destacan por sus vocalizaciones potentes que se escuchan a kilómetros de distancia. Esto es posible gracias a un hueso hioides especialmente desarrollado que amplifica el sonido. Poseen una cola muy larga y prensil que utilizan como una quinta extremidad para desplazarse entre los árboles. Son animales sociales que viven en grupos de hasta 20 individuos liderados por un macho dominante.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 3200 m.s.n.m.

- Zonas en las que habita la especie



ESPECIE
DEL PAISAJE

Mono maicero

Sapajus apella

Mamíferos

GRUPO

Cebidae

FAMILIA



PESA

Macho 3.7 kg ≈

Hembra 2.3 kg ≈



MIDE

Cuerpo 35 - 49 cm

Cola 38 - 49 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Frugívoro

DATO CURIOSO

Estos primates tienen la peculiar costumbre de frotar su cuerpo con su propia orina, lo cual les ayuda a marcar su olor y protegerse contra parásitos.

DESCRIPCIÓN

Posee un pelaje que varía de castaño claro a oscuro. Las extremidades y la cola presentan tonos más oscuros, generalmente marrón oscuro o negro. En la frente tiene mechones de pelo erecto que semejan "cachos". Su cola es semiprensil, utilizada para mantener el equilibrio mientras se desplaza. Son altamente inteligentes y exhiben comportamientos complejos, como el uso de herramientas para abrir frutos duros. Viven en grupos pequeños y tienen una jerarquía social marcada.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas y control de poblaciones de pequeños vertebrados.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 2700 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie



ESPECIE
DEL PAISAJE

Venado

Odocoileus cariacou

Mamíferos

Cervidae

GRUPO

FAMILIA



PESA
20 - 30 kg



MIDE
1.2 - 1.5 m



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Hervívoro

DATO CURIOSO

Los venados tienen una gran capacidad para camuflarse en su entorno, permaneciendo inmóviles por largos periodos para evitar ser detectados por depredadores.

DESCRIPCIÓN

Su coloración varía entre amarillo y rojizo. Los machos poseen astas que se bifurcan con los años, utilizadas en enfrentamientos durante la época de apareamiento. El pelaje en la zona ventral es más claro y la parte inferior de la cola es blanca, característica que utilizan como señal de alarma levantándola al percibir peligro. Son animales muy ágiles, capaces de realizar saltos considerables para evadir depredadores.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios
- Sabanas
- Pastizales

UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 600 m.s.n.m.

- Zonas en las que habita la especie





ESPECIE
BANDERA

Ocarro

Priodontes maximus

Mamíferos

GRUPO

Chlamyphoridae

FAMILIA



PESA
18 - 45 kg



MIDE
1.47 - 1.6 m



Estado de
conservación
global



Estado de
conservación
nacional



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Es el mamífero terrestre con mayor número de dientes, alcanzando cerca de cien. Sin embargo, no los utiliza para masticar, ya que su dieta está compuesta principalmente por hormigas y termitas.

DESCRIPCIÓN

Es el más grande de la familia de los armadillos. Su cuerpo está cubierto de placas protectoras formadas por escamas córneas de color marrón y gris. Posee una cola cubierta de pelos que le ayuda a mantener el equilibrio. Sus patas son cortas pero muy fuertes, con grandes garras adaptadas para excavar madrigueras. Es un animal solitario y de hábitos nocturnos. Se mueve lentamente pero puede excavar rápidamente para escapar de amenazas.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Arquitecto del ecosistema al cavar grandes madrigueras.




HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios
- Sabanas

UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 500 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie





ESPECIE
BANDERA

Lapa

Cuniculus paca

Mamíferos

Cuniculidae

GRUPO

FAMILIA



PESA
7 - 10 kg



MIDE
60 - 79 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Es el segundo roedor más grande de Sudamérica y puede mantenerse inmóvil por largos periodos de tiempo para evitar a los depredadores.

DESCRIPCIÓN

Tiene un pelaje corto de color castaño rojizo a café oscuro con manchas blancas dispuestas horizontalmente. Sus orejas son medianas y redondeadas. Sus ojos grandes reflejan luz roja durante la noche. Sus patas traseras, más largas que las delanteras, le permiten saltar. Su cuerpo es robusto, con un cuello corto y una cabeza relativamente grande. Es de hábitos nocturnos y suele refugiarse en madrigueras durante el día.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 2000 m.s.n.m.

- Zonas en las que habita la especie



Picture

Dasyprocta fuliginosa

Mamíferos

GRUPO

Dasyproctidae

FAMILIA



PESA
3.5 - 6 kg



MIDE
54 - 76 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Hervívoro

DATO CURIOSO

Este roedor tiene la habilidad de enterrar alimentos para almacenarlos, asegurando su supervivencia durante épocas de escasez.

DESCRIPCIÓN

Presenta un pelaje de color marrón oscuro a negro, con tonos rojizos en algunas partes del cuerpo. Tiene patas largas y delgadas adaptadas para correr rápidamente, mientras que su cuerpo compacto le permite moverse ágilmente en la vegetación densa. Suele encontrarse en parejas o en pequeños grupos.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1400 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie



Murciélago

Saccopteryx bilineata

Mamíferos

Emballonuridae

GRUPO

FAMILIA



PESA
6 - 12 g



MIDE
4.2 - 6.2 cm
(Longitud corporal)



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Los machos emiten feromonas para atraer a las hembras durante la época de reproducción, marcando su territorio con secreciones de sacos alares.

DESCRIPCIÓN

De pelaje marrón oscuro a negro con dos líneas blancas que recorren su espalda. Posee sacos alares (estructuras glandulares en las alas cercanas a los codos) que utiliza para la comunicación química. Tiene alas largas y angostas, diseñadas para maniobras rápidas en el aire. Es un animal social que vive en colonias y se comunica mediante vocalizaciones y señales químicas.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios
- Sabanas
- Pastizales
- Zonas urbanas



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1000 m.s.n.m.

- Zonas en las que habita la especie



ESPECIE
BANDERA

Cunaguaro

Leopardus pardalis

Mamíferos

Felidae

GRUPO

FAMILIA



PESA
7 - 8.8 kg



MIDE
Cuerpo 70 - 90 cm
Cola 30 - 40 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Carnívoro

DATO CURIOSO

Este felino es frecuentemente cazado por conflictos con humanos debido a la depredación de aves de corral en áreas donde sus presas naturales han disminuido.

DESCRIPCIÓN

Tiene un pelaje amarillento pardo con manchas negras distribuidas en patrones únicos. Su vientre es más claro y posee dos manchas negras características en las mejillas. Es un felino ágil y principalmente nocturno, con garras retráctiles que le permiten trepar árboles fácilmente. Es territorial y solitario, marcando su territorio con orina y arañazos en la vegetación.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de pequeños vertebrados.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 2400 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie



ESPECIE
BANDERA

Puma

Puma concolor

Mamíferos

Felidae

GRUPO

FAMILIA



PESA

Macho 53 - 72 kg

Hembra 34 - 48 kg



MIDE

Cuerpo 95 - 143 cm

Cola 53 - 82 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Carnívoro

DATO CURIOSO

Aunque es un gran felino, el puma no puede rugir como otros de su grupo, comunicándose a través de gruñidos, silbidos y gemidos.

DESCRIPCIÓN

Su pelaje es uniforme y puede variar en tonos rojizos, parduzcos o grisáceos según la región. Posee un rostro pálido con manchas blancuzcas alrededor del hocico y garganta. Tiene una cola larga con la punta oscura en forma de J y orejas redondeadas. Sus extremidades son fuertes, con garras retráctiles adaptadas para cazar grandes presas. Es un depredador silencioso y territorial, que evita el contacto con humanos y prefiere hábitats variados, desde bosques hasta zonas montañosas.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de vertebrados.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 4100 m.s.n.m.

- Zonas en las que habita la especie



Zorro gatuno

Herpailurus yagouaroundi

Mamíferos

GRUPO

Felidae

FAMILIA



PESA
3,5 - 9 kg



MIDE
Cuerpo 50 - 70 cm
Cola 30 - 60 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Carnívoro

DATO CURIOSO

Este felino es conocido por su gran capacidad vocal, con al menos 13 tipos de sonidos diferentes para comunicarse con otros individuos.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo alargado y esbelto, con patas cortas y cabeza pequeña y plana. Su pelaje varía de gris a marrón rojizo dependiendo de la edad. Tiene ojos pequeños pero agudos, adaptados para cazar durante el día. Es raro entre los gatos salvajes y prefiere hábitats de matorrales o áreas abiertas. Es territorial y solitario, aunque ocasionalmente se le observa en parejas.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de vertebrados.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios
- Sabanas



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 3200 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie



ESPECIE
BANDERA

Perro de agua

Pteronura brasiliensis

Mamíferos

GRUPO

Mustelidae

FAMILIA



PESA

Macho 32 - 45 kg

Hembra 22 - 26 kg



MIDE

1.5 - 1.7 m

(Longitud corporal)



Estado de
conservación
global



Estado de
conservación
nacional



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Carnívoro

DATO CURIOSO

Es el carnívoro más grande de Suramérica en ecosistemas acuáticos. Su comportamiento social lo convierte en un depredador cooperativo en grupos familiares.

DESCRIPCIÓN

Conocida también como nutria gigante de río por su gran tamaño. Tiene pelaje de color café oscuro con manchas claras amarillentas en el cuello, que son únicas para cada individuo (llamadas manchas gulares). Sus ojos son grandes y cafés y el hocico está redondeado. Posee patas palmeadas y cuerpo alargado están adaptados para la natación. Es social y vive en grupos familiares jerárquicos cerca de cuerpos de agua, donde caza peces y crustáceos.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones acuáticas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Ríos

UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1000 m.s.n.m.

- Zonas en las que habita la especie





Oso palmero

Myrmecophaga tridactyla

Mamíferos

GRUPO

Myrmecophagidae

FAMILIA



PESA
18 - 52 kg



MIDE
1.8 - 2.2 m
(Longitud corporal)



Estado de
conservación
global



Estado de
conservación
nacional



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Usa su lengua, de hasta 60 cm de largo, para capturar insectos en grandes cantidades. Es conocido en la región como oso palmero ya que su cola asemeja la forma de una hoja de palma.

DESCRIPCIÓN

Su hocico largo y tubular carece de dientes, pero alberga una lengua larga y pegajosa para capturar insectos como hormigas y termitas. Su pelaje varía de gris a marrón y posee una mancha negra triangular característica desde el pecho hacia la espalda. Sus extremidades tienen garras largas y fuertes que le sirven para excavar y defenderse.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios
- Sabanas
- Pastizales



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1900 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie



Oso melero

Tamandua tetradactyla

Mamíferos

Myrmecophagidae

GRUPO

FAMILIA



PESA

Macho 4.8 kg

Hembra 3.6 kg



MIDE

96 cm

(Longitud corporal)



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Insectívoro

DATO CURIOSO

Utiliza sus poderosas garras no solo para romper nidos de insectos, sino también para trepar árboles y defenderse de los depredadores.

DESCRIPCIÓN

Su pelaje dorado se extiende hasta la cola prensil, adaptada para trepar. Tiene un hocico curvado hacia abajo con una abertura pequeña de la que sobresale la lengua. Las extremidades anteriores tienen cada una cuatro dedos mientras que las posteriores tienen cinco. Cada dedo presenta una garra, ideales para rasgar termiteros y trepar árboles en busca de refugio. Es un animal solitario.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios
- Sabanas



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 2000 m.s.n.m.

- Zonas en las que habita la especie



Murciélago

Artibeus lituratus

Mamíferos

GRUPO

Phyllostomidae

FAMILIA



PESA
50 - 86 g



MIDE
8 - 10 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Frugívoro

DATO CURIOSO

Vive en grandes colonias, lo que le brinda protección contra depredadores al aprovechar la seguridad en grupo.

DESCRIPCIÓN

Es robusto, con ojos grandes adaptados para la visión nocturna. Su pelaje es grisáceo con dos líneas blancas en la cara. Posee una hoja nasal prominente que utiliza para ecolocación. Sus alas son anchas y permiten vuelos sostenidos en busca de refugios y frutas. Vive en grupos organizados.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios
- Sabanas
- Pastizales
- Zonas urbanas



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 2600 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Murciélago

Carollia perspicillata

Mamíferos

GRUPO

Phyllostomidae

FAMILIA



PESA
15 - 25 g



MIDE
56 - 90 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Frugívoro

DATO CURIOSO

Esta especie puede convivir en refugios con murciélagos de otras especies, formando comunidades mixtas.

DESCRIPCIÓN

Su cuerpo es compacto y robusto, con orejas triangulares y de tamaño mediano, adaptadas para detectar sonidos de alta frecuencia. Su cara es corta y ancha. El pelaje varía de marrón a gris, con una textura suave. Posee una hoja nasal en forma de lanza que le ayuda en la ecolocación y una cola corta que apenas sobresale de la membrana caudal. Son murciélagos sociales que viven en colonias.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios
- Sabanas
- Pastizales
- Zonas urbanas



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 2000 m.s.n.m.

- Zonas en las que habita la especie

Murciélago

Mesophylla macconnelli

Mamíferos

GRUPO

Phyllostomidae

FAMILIA



PESA
4 - 14 g



MIDE
4 - 5 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Frugívoro

DATO CURIOSO

Construye refugios temporales cortando hojas de plantas grandes, como palmas, para protegerse de depredadores y las inclemencias del clima.

DESCRIPCIÓN

De pelaje amarillo dorado brillante, con una banda blanca distintiva en la parte posterior. Su cara es corta y ancha, con ojos grandes que mejoran la visión nocturna. Las orejas son redondeadas, cortas y amarillas, al igual que la hoja nasal, que le ayuda en la orientación y búsqueda de alimento. Este murciélago tiene una apariencia peculiar y vive en refugios temporales, como hojas grandes, que a menudo modifica para protegerse.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas, polinización.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 1800 m.s.n.m.

- Zonas en las que se encuentra la especie

Murciélago

Phyllostomus hastatus

Mamíferos

Phyllostomidae

GRUPO

FAMILIA



PESA

55 - 140 g



MIDE

9 - 13 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Nocturno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Es el segundo murciélago más grande del Neotrópico y destaca por su fuerte jerarquía social dentro de los grupos.

DESCRIPCIÓN

Es un murciélago grande y musculoso, con orejas grandes, alas amplias y pelaje marrón oscuro a negro. Usa su hoja nasal (piel alrededor de la nariz) para ecolocación, vive en grupos jerárquicos liderados por un macho y es activo de noche.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas, polinización y control de poblaciones de insectos y pequeños vertebrados.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios
- Sabanas
- Pastizales
- Zonas urbanas



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 2000 m.s.n.m.

- Zonas en las que habita la especie

Cusumbo

Nasua nasua

Mamíferos

GRUPO

Procyonidae

FAMILIA



PESA
3 - 8 kg



MIDE
Cuerpo 40 - 67 cm
Cola 40 - 70 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Diurno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Las hembras y sus crías forman grupos sociales conocidos como bandas, que pueden tener hasta 20 individuos, mientras que los machos suelen ser solitarios.

DESCRIPCIÓN

Tiene un pelaje rojizo a marrón, con una cola anillada en tonos claros y oscuros. Su cuerpo es alargado, con patas cortas y un hocico flexible. Es un animal social que vive en grupos conocidos como bandas, liderados generalmente por hembras adultas. Su comportamiento incluye cavar y explorar constantemente en busca de refugio o recursos.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas, control de poblaciones de insectos.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 3600 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie



ESPECIE
SOMBRILLA

Danta

Tapirus terrestris

Mamíferos

Tapiridae

GRUPO

FAMILIA



PESA
180-300 kg



MIDE
1.8 - 2.4 m



Estado de
conservación
global



Estado de
conservación
nacional



Hábito
Crepuscular/
Nocturno



Gremio trófico
Hervívoro

DATO CURIOSO

Su trompa prensil no solo le permite alimentarse, sino también explorar su entorno y detectar olores.

DESCRIPCIÓN

Es el mamífero más grande de Suramérica. Posee patas cortas y fuertes que soportan su peso considerable. El hocico es alargado, flexible y prensil, una adaptación que utiliza para agarrar hojas y frutos. Su pelaje es corto y grueso, de color marrón oscuro a negro, con manchas más claras alrededor de la cara. Tiene cuatro dedos en las patas delanteras y tres en las traseras, lo que le permite moverse con facilidad en terrenos pantanosos. Es un animal tímido y solitario. Prefiere zonas de bosque denso cerca de fuentes de agua.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas, arquitecta del paisaje.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios



UBICACIÓN EN COLOMBIA

Entre los 0 - 2400 m.s.n.m.

- Zonas en las que habita la especie



Chácharo / Pecarí

Dicotyles tajacu

Mamíferos

GRUPO

Tayassuidae

FAMILIA



PESA
15 - 25 kg



MIDE
70 - 110 cm



Estado de
conservación
global



Hábito
Crepuscular/
Nocturno



Gremio trófico
Omnívoro

DATO CURIOSO

Aunque suelen ser animales silenciosos, emiten gruñidos o chillidos cuando se sienten amenazados. Su agilidad para nadar les permite cruzar ríos o escapar de depredadores.

DESCRIPCIÓN

Tiene cuerpo compacto, patas cortas y fuertes, cabeza ancha y hocico alargado para excavar. Su pelaje es áspero, marrón oscuro con una banda blanca tipo collar en el cuello. Es social y vive en grupos jerárquicos llamados manadas.

SERVICIO ECOSISTÉMICO

Dispersión de semillas, arquitecto del paisaje.



HÁBITAT Y COBERTURAS VEGETALES
ASOCIADAS

- Bosque húmedo tropical
- Bosques secundarios
- Sabanas
- Pastizales



UBICACIÓN
EN COLOMBIA

Entre los 0 - 2800 m.s.n.m.

● Zonas en las que se encuentra
la especie

I Bibliografía

Acero L E. (2005). Plantas útiles de la cuenca del Orinoco. B.P Exploration company panamericana formas e impresos Colombia, Pp 608.

American Society of Mammalogists. (2025). Mammal Diversity Database. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15007505>.

Angarita-Sierra, T., Ospina-Sarria, J., Anganoy-Criollo, M., Pedroza-Banda, R., & Lynch, J. D. (2013). Guía de campo de los Anfibios y Reptiles del departamento de Casanare-Colombia. Serie Biodiversidad para la Sociedad. Universidad Nacional de Colombia, Sede Orinoquía; YOLUKA ONG, Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/51741>

Aponte-Gutiérrez, A. F., Arias Escobar, A., Niño Cárdenas, L., Lopez, C. A., & Lynch, J. D. (2020). Diversidad de anfibios y reptiles del territorio sabanas y humedales de Arauca, Colombia. In Colombia diversidad biótica XX: territorio sabanas y humedales de Arauca. Universidad Nacional de Colombia.

Ayerbe-Quiñones, F. (2022). Guía Ilustrada de la Avifauna Colombiana (3rd ed.). Wildlife Conservation Society.

Blanco-Torres, A., Bastidas-Molina, B., & Parra-Torres, F. (2017). Variación espacial y temporal de la herpetofauna en ecosistemas de sabanas inundables de la Orinoquía-Colombia. *Caldasia*, 39(2), 354–369. <https://doi.org/10.15446/caldasia.v39n2.63489>

Boron, V., Deere, N. J., Xofis, P., Link, A., Quiñones-Guerrero, A., Payan, E., & Tzanopoulos, J. (2019). Richness, diversity, and factors influencing occupancy of mammal communities across human-modified landscapes in Colombia. *Biological Conservation*, 232, 108–116. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.01.030>

Camaripano, B. & A. Castillo. (2003). Catálogo de especies espermatófitas del bosque estacionalmente inundable del Río Sipapo, estado Amazonas, Venezuela. *Acta Bot. Venez.* 26(2): 125-229.

Campbell, M. O. (2015). *Vultures*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/b18638>

Cárdenas, D. & R. López. (2000). Plantas útiles de la Amazonía- colombiana Departamento del Amazonas-. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá.

Corpoamazonia. (2024). Protocolo para el manejo sostenible de la especie Asaí (*Euterpe precatoria* Mart.) con énfasis en la cosecha de frutos y semillas.: https://www.corpoamazonia.gov.co/files/-consultas/2024/20241017_01.pdf

Defler, T. Richard. (2010). Historia natural de los primates colombianos (Second edition). Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología. https://www.researchgate.net/publication/232631865_Historia_Natural_de_los_Primates_Colombianos

Echeverry-Galvis, M. Á., Acevedo-Charry, O., Avendaño, J. E., Gómez, C., Stiles, F. G., Estela, F. A., & Cuervo, A. M. (2022). Lista oficial de las aves de Colombia 2022: Adiciones, cambios taxonómicos y actualizaciones de estado. *Ornitología Colombiana*, (22), 25–51. <https://doi.org/10.59517/oc.e548>

Eisenberg, J. F., & H, R. K. (1999). Mammals of neotropics – The central neotropics V III. 610. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/M/bo3696756.html>

Ferrer Pérez, A., Beltrán, M., Díaz-Pulido, A. P., Trujillo, F., Mantilla-Meluk, H., Herrera, O., Alfonso, A. F., & Payán, E. (2009). Lista de los mamíferos de la cuenca del río Orinoco. *Biota Colombiana*, 10(1–2), 179–207.

Frost, D. R. (2026). Amphibian Species of the World: an Online Reference. American Museum of Natural History.

Galeano, G., & Bernal, R. (2010). Palmas de Colombia: Guía de campo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Instituto de Ciencias Naturales. ISBN: 978-958-719-501-9

Garizábal-Carmona, J. A. (2020). Effects of urban green spaces composition and structure on local bird diversity: A study case in Colombian Northern Andes . Universidad Nacional de Colombia.

GBIF.org. (2025). GBIF: Fondo Mundial de Información sobre Biodiversidad.

Gentry, A. H. (1992). A synopsis of Bignoniaceae ethnobotany and economic botany. *Annals of the Missouri Botanical Garden*, 53-99.

Gentry, A. H. 1982. Patterns of Neotropical plant species diversity. *Evolutionary Biology* 15:1-84

Hilty, S. L. (2021). Birds of Colombia. Lynx Edicions.

IUCN. (2025). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1.

Kunz, T. H., de Torrez, E. B., Bauer, D., Lobova, T., & Fleming, T. H. (2011). Ecosystem services provided by bats. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1223(1), 1–38. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2011.06004.x>

Kushlan, J. A., & Hancock, J. A. (2005). Herons: Bird Families of the World. Herons. <https://doi.org/10.1093/OSO/9780198549819.001.0001>

Larson, R. N., & Sander, H. A. (2025). Variation in species-specific responses to habitat fragmentation and land cover structure in urban small mammal communities. *Journal of Mammalogy*, 106(2), 339–351. <https://doi.org/10.1093/jmammal/gyae121>

Lasso, C. A., Usma, J. S., Trujillo, F., & Rial B., A. (2010). Biodiversidad de la cuenca del Orinoco: bases científicas para la identificación de áreas prioritarias para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. (March 2015), 292–309. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/9677>

Medellín, R. A., Equihua, M., & Amin, M. A. (2000). Bat Diversity and Abundance as Indicators of Disturbance in Neotropical Rainforests. *Conservation Biology*, 14(6), 1666–1675. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2000.99068.x>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2024). Lista de especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica continental y marino-costera de Colombia - Resolución 0126 de 2024 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Morales-Betancourt, M. A., Lasso, C. A., Páez, V. P., & Bock, B. C. (2015). Libro rojo de reptiles de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Universidad de Antioquia.

Morcote R., G., G. Cabrera, D. Mahecha, C. E. Franky C., & I. Cavellier. 1998. Las palmas entre los grupos cazadores-recolectores de la Amazonia colombiana. *Caldasia* 20(1): 57-74.

Mosquera Guerra, F., Trujillo, F., Aya Cuero, C., Bolívar, L., Valencia, K., Vargas Arboleda, A. F., &

Mantilla Meluk, H. (2019). Mamíferos. In F. Trujillo & F. Anzola (Eds.), *Biodiversidad en el departamento de Arauca*. Gobernación de Arauca, Fundación Omacha y Fundación Ecollano.

Muscarella, R., & Fleming, T. H. (2007). The role of frugivorous bats in tropical forest succession. *Biological Reviews*, 82(4), 573–590. <https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.2007.00026.x>

Naranjo, L. G., Amaya, J. D., Eusse-González, D., & Cifuentes-Sarmiento, Y. (2012). Guía de las Especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia. Aves. Vol. 1. (Vol. 1). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible / WWF Colombia.

Navarro, J. F., Arias-Alzate, A., & Delgado-V., C. A. (2024). Huellas y rastros de los mamíferos en Colombia. In *Huellas y rastros de los mamíferos en Colombia*. Editorial CES. <https://doi.org/10.2307/jj.35297709>

Payevsky, V. A. (2014). Phylogeny and classification of passerine birds, passeriformes. *Biology Bulletin Reviews*, 4(2), 143–156. <https://doi.org/10.1134/S2079086414020054>

Pedroza-Banda, R., Jairo Ospina-Sarria, J., Angarita-Sierra, T., Anganoy-Criollo, M., & Lynch, J. D. (2014). Estado del conocimiento de la fauna de anfibios y reptiles del departamento de Casanare, Colombia *Ciencias naturales*.

Pérez-Gómez, K., Fernández-Rodríguez, R. C., & Moreno-Niño, N. (2025). Guía Ilustrada de los Mamíferos de Colombia. Primera Edición. McMullan Birding & Publishers S.A.S. Plants of the World Online (POWO). (s.f.). Royal Botanic Gardens, Kew. <https://powo.science.kew.org/>

Ramírez-Chaves, H., Morales-Martínez, D. M., Rodríguez-Posada, M. E., & Suárez-Castro, A. F. (2022). Checklist of the mammals (Mammalia) of Colombia. *Mammalogy Notes*, 7(2), 253. <https://doi.org/10.47603/mano.v7n2.253>

Rangel-Ch., J. O. (Ed.). (2015). Libro rojo de plantas de Colombia. Serie Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia

Reboreda, J. C., Fiorini, V. D., & Tuero, D. T. (2019). Behavioral Ecology of Neotropical Birds. *Behavioral Ecology of Neotropical Birds*, 1–220. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-14280-3/COVER>

Remsen, J. V, Areta, J. I., Bonaccorso, E., Claramunt, S., Lane, D. F., Robbins, M. B., Stiles, F. G., & Zimmer, K. J. (2025). A classification of the bird species of South America. Version 24 June 2025. Museum of Natural Science, Louisiana State University.

Romero-Día, C., Ugalde-Lezama, S., García-Núñez, R. M., Marcos-Rivera, U., & Cruz-Miranda, Y. (2020). Comportamiento trófico de aves insectívoras en sistemas agroforestales inmersos en bosque mesófilo. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 11(2), 241–252. <https://doi.org/10.29312/remexca.v11i2.2298>

Rueda-Almonacid, J. V., Carr, J. L., Mittermeier, R. A., Rodríguez-Mahecha, J. V., Mast, R. B., Vogt, R. C., Rhodin, A. G. J., de la Ossa -Velásquez, J., Rueda, J. N., & Mittermeier, C. G. (2007). Conservación internacional serie guías tropicales de campo No. 6. Las tortugas y los cocodrilianos de los países andinos del trópico. *Conservación Internacional - Série de Guías Tropicales de Campo*, 6, 538. https://www.researchgate.net/publication/261875715_Las_Tortugas_y_los_Cocodrilianos_de_los_Paises_Andinos_del_Tropico

Sarasola, J. H., Grande, J. M., & Negro, J. J. (2018). Birds of prey: Biology and conservation in the XXI century. *Birds of Prey: Biology and Conservation in the XXI Century*, 1-522. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-73745-4/COVER>

Sarmiento G. Sabanas naturales, génesis y ecología. En: *Sabanas Naturales de Colombia*. Cali, Banco de Occidente, 1994. Pp. 17-55.

Sekercioğlu, C., & Buechley, E. R. (2016). Avian ecological functions and ecosystem services in the tropics. *Why Birds Matter*, 321-340.

SiB Colombia. (2025). Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia.

Stephens, D. W. ., & Krebs, J. R. . (1986). *Foraging theory*. 247.

Steyermark J.A., P.E. Berry, B. Holst (Gen. Eds.) 1995-2005. *Flora of the Venezuelan Guayana*. Volumen 1-9: Missouri Botanical Garden, St. Louis.

Stotz, D. F. . (1996). *Neotropical birds: ecology and conservation*. 478.

Thomas, E. L., & Alho, C. J. R. (2001). Terrestrial small mammal richness and habitat associations in an Amazon Forest - Cerrado contact zone. *Biotropica*, 33(1), 171-181. <https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2001.tb00166.x>

Trujillo, F. (2021). *Mamíferos de los Llanos*. Fundación Omacha, Cepsa.

Trujillo, F., & Mosquera-Guerra, F. (2016). 7. Caracterización, Uso y Manejo De La Mastofauna Asociada A Los Morichales De Los Llanos Orientales Colombianos. In C. A. Lasso, G. Colonnello, & M. Moraes R. (Eds.), *XIV. Morichales, cananguchales y otros palmares inundables de Suramérica. Parte II: Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia*. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Trujillo, G. A. (2015). *Diversidad De Los Reptiles De La Orinoquía Colombiana: Análisis De Los Patrones De Distribución Y Relaciones Ambientales*. Universidad Nacional de Colombia.

Uetz, P., Freed, P., & Hošek, J. (2026). *The Reptile Database*.

Vitt, L. J., & Caldwell, J. P. (2013). *Herpetology: An Introductory Biology of Amphibians and Reptiles: Fourth Edition*. *Herpetology: An Introductory Biology of Amphibians and Reptiles: Fourth Edition*, 1-757. <https://doi.org/10.1016/C2010-0-67152-5>

Voss, R. S., Lunde, D. P., & Simmons, N. B. (2001). The mammals of Paracou, French Guiana, a Neotropical lowland rainforest fauna. Part 2, Nonvolant species. *Bulletin of the AMNH*; no. 263. [New York]: American Museum of Natural History. <http://hdl.handle.net/2246/386>



Wenny, D. G., & Levey, D. J. (1998). Directed seed dispersal by bellbirds in a tropical cloud forest. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 95(11), 6204–6207. <https://doi.org/10.1073/pnas.95.11.6204>

WikiAves Icesi. Universidad Icesi. (2025). Wiki Aves Colombia: El sitio de las aves de Colombia. <https://wikiaves.icesi.edu.co/>

William E. Duellman, Ph. D. (2023). Patterns of Distribution of Amphibians. *Patterns of Distribution of Amphibians*. <https://doi.org/10.56021/9780801861154>

